

Příznaky onemocnění při nákaze AMP

AMP - africký mor prasat



Klinické příznaky: horečka $>41,5^{\circ}\text{C}$, shlukování, cyanóza, mortalita $>30\%$



Cyanóza uší a distálních částí končetin



Mukopurulentní výtok z rypáku



Slezina: 2-3x zvětšená slezina s infarkty a tečkovitými krváceninami




Plíce



Žaludek - sliznice



Ledviny



Příznaky afrického moru prasat

Nerozlišitelné od klasického moru prasat. Ztráta chuti k žrádлу, deprese, vysoká horečka ($40-42^{\circ}\text{C}$), poloha vleže. Petechie, překrvění kůže uší, břicha a končetin, dýchací potíže, zvracení, krvácení z nosu nebo konečníku, průjem, zmetání. Stupeň mortality (0–100 %) závisí na virulenci kmene. Krváceniny v mizních uzlinách, srdci, ledvinách (nejčastěji petechie, ale také ekchymózy). Zvětšení a křehkost sleziny. Slámově zbarvená nebo krví zbarvená tekutina v pleurální, perikardiální a peritoneální dutině. Plíce – edém a překrvění.


Príznaky onemocnění při nákaze AMP

Přenos:

Především oronazální cesta. Může být přes dolní dýchací trakt. Intradermálně kousnutím infikovaných klíšťat *Ornithodoros sp.*



Šíření



Odběr vzorků



VZORKY DO LABORATOŘE

krev a sérum



mízní uzliny



plíce



slezina a ledviny

